



## HOJA TÉCNICA 1. TILMICOB

**CODIGO: TILM**  
**Versión: 4**  
**23-Mar-2021**

Elaborado por:  
Katherine Chicaiza  
ASID

Revisado por:  
Cristian Góngora  
DIME

Aprobado por:  
Jorge Vergara  
GECO

### 2. Composición:

Cada 100 mL contiene:  
Fosfato de Tilmicosina 7,5 g  
Acetaminofén (Paracetamol) 0,5 g  
Excipiente c.s.p. 100 mL

**Acción terapéutica:** Antibiótico

**Forma farmacéutica:** Solución Oral

### 3. Indicaciones de uso:

La Tilmicosina es el macrólido modificado de más reciente introducción, tiene actividad antibacteriana y antimicoplásmica.

TILMICOB está indicado para el tratamiento y control de enfermedades respiratorias asociadas con *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Ornithobacterium rinothacheale* y *Pasteurella multocida* en aves.

### 5. Dosis sugerida:

**Dosis terapéutica:** 20 mg PA / kg de peso vivo

**Dosis técnica del producto:** Puede emplearse la siguiente tabla de dosificación:

TILMICOB	
8 gotas	1 kg de P.V.
2.6 mL	10 kg de P.V.
1 L	3.750 kg de PV o 1850 aves con un peso promedio de 2 kg

TILMICOB mL	AGUA DE BEBIDA LITROS
1 mL (25 gotas)	1
50 mL	50
100 mL	100
200 mL	200
400 mL	400
1.000 mL	1.000
2.000 mL	2.000

TILMICOB debe ser disuelto en el agua de bebida para su administración.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

### 5. Forma de administración:

Oral. Directamente con el gotero en el pico del ave cuando se trata individualmente o en el agua de bebida cuando se trate grandes cantidades de aves. Disuelto en el agua de bebida. Usar soluciones frescas. El agua medicada debe ser la única fuente de bebida durante el tratamiento, calculando la cantidad necesaria de agua que consuman las aves en 12 horas.

Se recomienda restringir el agua de bebida 1 hora antes de medicar.

### 5. USO VETERINARIO

#### 11. Condiciones de almacenamiento:

Mantener el envase bien cerrado.

Neutralizar el agua de bebida antes de medicar.

No debe aplicarse conjuntamente con otros productos antibacterianos.

Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.

Proteger de la luz solar.

#### 6. Advertencias:

No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.

No reutilizar este envase.

13. Venta bajo receta médica.

14. MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### 12. Tiempo de retiro:

7 días antes del sacrificio de las aves.

#### 4. Presentación:

Gotero x 10 mL

Frasco x 1 Litro

#### 10. Fabricado y distribuido por

C.C. Laboratorios Pharmavital Cía Ltda

km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167

[www.cclabs.com.ec](http://www.cclabs.com.ec)

Q.F.R.: Nelly López de Cobo

**7. Reg. n. °: 2C1-10535-AGROCALIDAD**